

VIT. E-C-SE-LECITHINE

Tijdens een training produceren de spieren afvalstoffen. Vitamine E en selenium zijn nodig bij de afvoer van deze afvalstoffen. Bovendien zijn vitamine E en selenium nauw aan elkaar verbonden. De één kan zijn werk niet goed doen zonder de ander. Lecithine bevordert bovendien de activiteit van vitamine E en biedt zo indirecte bescherming tegen de afvalstoffen in de spieren.

VOERADVIES

Voor een pony is de dosering 25-40 gram per dag.

Voor een paard is de dosering 50-60 gram per dag.

SAMENSTELLING

Dextrose, Sojalecithine*, Raapolie.

* *Geproduceerd uit genetisch gemodificeerde sojalecithine.*

VERKRIJGBAAR IN

▼ Emmers van 1 kg

VOEDERWAARDEN

Ruw eiwit	9,77 g	Calcium	3,79 g
Ruw vet	153,95 g	Fosfor	5,63 g
Ruwe celstof	0,20 g	Natrium	0,03 g
Ruw as	39,06 g	Magnesium	0,10 g
Zink (sulfaat)	5.500 mg	Vitamine H Biotine	200.000 mcg
Zink (chelaat)	3.000 mg	Vitamine E	20.000 mg
Selenium	40 mg	Vitamine C	30.000 mg
		Lecithine	150.000 mg

Aanvullend diervoeder voor paarden.
Koel en droog bewaren.

